

## シングリックスの安全性

- 多くの方に注射部位の痛みや腫れがあらわれます。  
副反応の持続日数の中央値\*は3日でした。

\* 持続日数を小さい順に並べたデータのちょうど中央にある日数

シングリックス接種後7日間に起こった主な副反応

注射した部位	痛み [78%]	赤み [38%]	腫れ [26%]
注射部位以外	筋肉痛 [40%]	疲労 [39%]	頭痛 [33%]
	悪寒 [24%]	発熱 [18%]	胃腸症状 [13%]

[ ]内は副反応が起こった人の割合

承認時評価資料: 国際共同第Ⅲ相臨床試験, ZOSTER-006/022併合解析  
(ここで紹介しているデータはそれぞれ50歳以上と70歳以上を対象とした2つの臨床試験のものです。)

気になる症状があれば、医師にご相談ください。



## シングリックス接種後の注意

- 1 接種後30分程度は、接種した施設で安静にしましょう。  
体調の変化がないことを確認しましょう。



- 2 接種当日は激しい運動を避け、注射部位を清潔に保ってください。  
接種当日の入浴はさしつかえありません。



- 3 注射部位の異常な反応や体調の変化を感じた場合は、すぐに医師の診察を受けてください。

- 4 シングリックスの接種により健康被害が発生した場合には「医薬品副作用被害救済制度」により治療費等が支給される場合があります。詳しくは独立行政法人医薬品医療機器総合機構のホームページ等をご覧ください。

医療機関名



編集  
協力

永井 英明 先生

独立行政法人国立病院機構 東京病院感染症科 部長

グラクソ・スミスクライン株式会社

# シングリックスは、 带状疱疹を予防するための ワクチンです。

接種対象者

- 50歳以上の方
- 带状疱疹に罹患するリスクが高いと考えられる18歳以上の方<sup>注)</sup>

注) ・疾病または治療により免疫不全である方、免疫機能が低下した方または免疫機能が低下する可能性がある方  
 ・上記以外で、医師が本剤の接種を必要と認めた方

## シングリックスは不活化ワクチン

- 带状疱疹ワクチンには不活化ワクチンと生ワクチンとがありますが、シングリックスは不活化ワクチンです。

## ワクチンは大きく2つに分けられます

### 不活化ワクチン：


病原性をなくした細菌やウイルスの一部を成分としたワクチン  
B型肝炎、肺炎球菌ワクチン など

### 生ワクチン：

病原性を弱めた細菌やウイルスそのものを成分としたワクチン  
MR(麻しん・風しん混合)ワクチン など

## シングリックスの接種回数

- 2回の接種で、带状疱疹に対する**予防効果**が得られます。




## シングリックスの接種方法

- シングリックスは、**2回の筋肉内注射**が必要です。

- 50歳以上の方


通常、1回目の接種から2ヵ月の間隔<sup>\*1</sup>をおいて2回目の接種を行う



※1 例:1回目の接種が10月10日の場合、12月10日から2回目の接種が可能

- 带状疱疹に罹患するリスクが高いと考えられる18歳以上の方<sup>注)</sup>

通常、1回目の接種から1~2ヵ月の間隔<sup>\*2</sup>をおいて2回目の接種を行う



※2 標準として、1回目の接種から2ヵ月の間隔をおいて2回目の接種を行う

注) ・疾病または治療により免疫不全である方、免疫機能が低下した方または免疫機能が低下する可能性がある方  
 ・上記以外で、医師が本剤の接種を必要と認めた方

詳しくは、医師の指示に従ってください。

## 予防接種を受けることができない方

- 明らかに発熱(37.5℃以上)している方
- 重い急性疾患にかかっていることが明らかな方
- 過去にこのワクチンの成分によってアナフィラキシー<sup>\*</sup>を起こしたことがある方
- その他、医師が予防接種を受けることが不相当と判断した方

※ 通常接種後30分以内に出現する呼吸困難や全身性のじんましんを伴う重いアレルギー反応のこと

## 予防接種を受ける前に、医師への相談が必要な方

- 心臓血管系・腎臓・肝臓・血液などの基礎疾患のある方
- 予防接種で接種後2日以内に発熱のみられた方、全身性発疹などのアレルギーを疑う症状がみられた方
- このワクチンの成分に対して、アレルギーを起こすおそれのある方
- 過去にけいれんを起こしたことがある方
- 過去に免疫不全と診断された方、近親者に先天性免疫不全症の方がいる方
- 血小板が少ない方や出血しやすい方
- 妊婦または妊娠している可能性のある方、授乳中の方
- 最近1ヵ月以内に予防接種を受けた方

